

Warszawa, dnia 20 czerwca 2018 r.

**Informacja o rozpatrzeniu petycji wielokrotnej
w sprawie zaprzestania prowadzenia odstrzału sanitarnego dzików w związku
ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń**

Na wezwanie Głównego Lekarza Weterynarii, zgodne z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195 r.), opublikowane w dniu 20 lutego br., dotyczące rozpatrzenia petycji wielokrotnej w sprawie zaprzestania prowadzenia odstrzału sanitarnego dzików w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Polski, do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęło drogą elektroniczną 11 petycji w przedmiotowej sprawie.

W odpowiedzi na ww. petycję wielokrotną informuję, że dziki są rezerwuarem wirusa ASF w Polsce i stanowią jedno ze źródeł zakażenia tym wirusem dla świń. Skutkiem ewentualnego dalszego rozprzestrzenienia się ASF na terytorium Polski, w tym za pośrednictwem dzików, jest narażenie kraju na ogromne straty finansowe związane przede wszystkim z możliwym całkowitym zablokowaniem eksportu świń lub wieprzowiny do krajów trzecich, a także brakiem możliwości prowadzenia handlu ww. zwierzętami lub produktami pochodzącymi od tych zwierząt wewnątrz Unii Europejskiej.

Jednocześnie należy podkreślić, że zwalczanie chorób zakaźnych, w tym ASF, w populacji zwierząt dzikich jest bardzo trudne. Zwierzęta te migrują, stale rozmnażają się. Dodatkowo, w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost populacji dzików w Polsce.

W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt objętej obowiązkiem zwalczania, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.), jednym ze środków możliwych do podjęcia przy podejrzeniu wystąpienia lub wystąpienia choroby jest nakazanie odstrzału sanitarnego zwierząt wolnożyjących, w tym dzików.

Decyzję o zastosowaniu tego środka podejmuje w oparciu o ww. przepisy właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda, biorąc pod uwagę m.in. sytuację epizootyczną oraz poziom gęstości populacji dzika na danym obszarze.

Z uwagi na fakt, iż możliwość szerzenia się wirusa ASF wśród dzików jest ściśle zależna m.in. od gęstości występowania tych zwierząt na danym obszarze, obniżenie ich liczebności ogranicza ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby na niezakażone części kraju oraz wystąpienia jej u świń.

Dodatkowo należy podkreślić, iż odstrzał dzików prowadzony jest głównie w ramach gospodarki łowieckiej i przewyższa on odstrzał sanitarny przewidziany w strategii zwalczania wirusa ASF. W okresie 01.04.17 -31.03.18 dziki pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego stanowiły ok. 6% wszystkich dzików odstrzelonych na terytorium Polski.

Tylko podejmowanie wielokierunkowych, skoordynowanych działań na obszarze całego kraju w celu zwalczania ASF, w tym poprzez ograniczenie populacji dzików, poszukiwanie i bezpieczne usuwanie zwłok padłych dzików, a także ścisłe przestrzeganie przez hodowców zasad bioasekuracji, daje realną szansę na skuteczne zwalczanie tej choroby i ograniczenie strat finansowych związanych z wystąpieniem tej choroby na terytorium Polski.

Mając na uwadze powyższe, Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż odstrzał sanitarny będzie wykonywany w każdym przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność z punktu widzenia epizootycznego.

GLÓWNY LECYBZ WETERYNARI
Pawel Kozłowski